



1. Identificació i descripció del procediment

Hem estudiat els símptomes que vosté patix i realitzat les exploracions complementàries oportunes, i hem trobat una malaltia de les venes de les extremitats inferiors, que consistix en la dilatació d'estes. A banda dels símptomes propis de les varius (dolor, unflor, formiguejos, rampes, cansament), depenent de l'evolució del seu procés patològic, pot arribar a tindre complicacions com ara varicoflebitis (inflamació d'una variu), varicorràgia (sagnat per la variu) i úlcera venosa, que és la mas freqüent de les complicacions.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

L'objectiu de la intervenció és evitar les molèsties en la mesura que es puga i previndre les complicacions, per mitjà de lligadures i extirpació de les venes dilatades.

Els beneficis esperats són la desaparició o millora de les molèsties i la desaparició de les dilatacions venoses.

3. Alternatives raonables a este procediment

En principi no hi ha una alternativa vàlida científicament comprovada.

4. Conseqüències previsibles de la realització

Depenent de la tècnica realitzada, es pot esperar una incorporació immediata a la vida normal.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En cas de no intervindre's cal esperar una evolució de la malaltia amb aparició de les complicacions habituals d'esta patologia: edemes, hipodermatitis, varicoflebitis, varicorràgia i úlcera venosa.

6. Riscos freqüents

Les complicacions són habitualment de poca importància:

Aparició d'hematomes en les ferides operatòries o en el trajecte de les venes extirpades, que solen desaparèixer en un temps moderat.

La infecció de la ferida quirúrgica és una complicació excepcional, però no s'ha de descartar. Es poden produir lesions d'algun nervi perifèric que estiga prop de les venes extirpades, la qual cosa dóna lloc a sensació d'endormiscament o de formigueig o fins i tot una certa impotència funcional transitòria en zones de la cama. Poden aparèixer cicatrius hipertròfiques (queloides). Flebitis d'algun segment de vena, que solen cursar de forma benigna.

L'aparició de trombosi venosa profunda i embòlia pulmonar és altament improbable. L'hemorràgia per dehiscència d'alguna lligadura venosa té una incidència molt baixa.

7. Riscos poc freqüents

Hi ha riscos poc freqüents inherents a qualsevol intervenció quirúrgica de risc moderat.

8. Riscos en funció de la situació clínica personal del pacient

Els riscos seran majors en funció de la grandària de les varius, l'edat del pacient i la presència de malalties associades.

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat

