



1. Identificació i descripció del procediment

El raspat obstètric consisteix en una operació vaginal, que es realitza a cegues en la qual, després de la dilatació del canal cervical de l'úter, es procedix a la neteja de la cavitat d'este. Esta intervenció requereix l'ús d'anestèsia i és possible que durant la intervenció o després d'esta siga necessària la utilització de sang i/o hemoderivats.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Amb este procediment es pretén netejar l'interior de la cavitat uterina, extraient les restes que hi pugen quedar de la gestació anterior. Amb això s'afavorix una millor contracció de la fibra uterina i es prevenen les hemorràgies i les infeccions.

3. Alternatives favorables a este procediment

L'alternativa és no fer res, i en este cas hi ha un risc augmentat d'hemorràgia o d'infecció. Quan ja s'han fet dos raspats i la pacient continua presentant símptomes que aconsellen la realització d'un tercer, este es realitzarà si és possible amb histeroscòpia.

4. Conseqüències previsibles de la realització

S'està sotmés a riscos derivats de l'acte quirúrgic i de l'administració d'anestèsia. Esta és imprescindible perquè, si no s'utilitza, es pot alterar la vida de la pacient.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

Hi haurà agreujament dels símptomes actuals o aparició de nous. Continuarà depenent de controlar el procés amb medicaments.

6. Riscos freqüents

A pesar de l'adequada elecció i realització de la tècnica, es poden presentar efectes indesitjables, tant els comuns derivats de tota intervenció:

- Endometritis, infeccions d'orina.

7. Riscos poc freqüents

Es poden donar altres riscos que, encara que són poc freqüents, revisten més gravetat:

- Perforació uterina.

Les complicacions se solen resoldre amb tractament mèdic (antibiòtics, gel, repòs, etc.), però poden arribar a requerir una reintervenció, generalment d'urgència, incloent-hi un risc mínim de mortalitat. També s'han de considerar les complicacions derivades de l'anestèsia que el procediment requereix.

8. Riscos en funció de la situació clínica personal del pacient

La pacient advertirà de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars o de qualsevol altra, o de qualsevol circumstància que la separe de la normalitat i de la qual tinga constància que és portadora.

La situació vital d'una pacient en un moment determinat pot modificar-se per: diabetis, obesitat, hipertensió, anèmia, edat, etc., i això fa que es modifiquen els riscos de la intervenció.

9. Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

10. Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat

