



## 1. Identificació i descripció del procediment

La intervenció de trasplantament de còrnia consisteix en la substitució de la còrnia malalta per una altra còrnia sana, procedent de la donació de cadàver. El trasplantament corneal consisteix en el tallat i l'extracció del teixit corneal opac i substitució d'un empelt de còrnia del donant.

## 2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

L'objectiu d'esta cirurgia és millorar la visió del pacient.

Aconseguir una visió útil, sempre que no existisquen altres patologies oftalmològiques associades que ho impedisquen.

## 3. Alternatives raonables a este procediment

El trasplantament de còrnia és l'alternativa més raonable als processos patològics que cursen amb pèrdua de transparència de la còrnia.

Hi ha altres procediments per a casos molt especials com les queratopròtesis, el trasplantament laminar de còrnia o la queratectomia fototerapèutica (PTK) amb làser excimer.

## 4. Conseqüències previsibles de la realització

Recuperació de la transparència de la còrnia i consegüentment de la visió, que no és màxima almenys fins que es retiren els punts de sutura i la posterior graduació, com a mínim un any després de la cirurgia.

## 5. Conseqüències previsibles de la no-realització

Si la cirurgia no es realitza persistirà la pèrdua parcial o total de la visió.

## 6. Riscos freqüents

Sol quedar un defecte de refracció, especialment astigmatisme, que es pot corregir totalment o parcialment amb ulleres o amb una segona intervenció.

Altres complicacions menys freqüents són el rebug del trasplantament, la reobertura de la ferida, l'augment de la pressió intraocular, la inflamació ocular, la deformitat de la pupil·la, la cataracta secundària, la luxació del cristal·lí o la pèrdua del fluid intern de l'ull.

En els casos de distròfies corneals és possible la recidiva de la malaltia en la còrnia donant.

## 7. Riscos poc freqüents

Hi ha riscos derivats de l'anestèsia, que pot ser general o amb infiltració de l'anestèsic al voltant de l'ull. Entre els riscos de l'anestèsia periocular estan l'hemorràgia retrobulbar, l'oclusió de l'artèria central de la retina, la lesió del nervi òptic, la perforació ocular, la depressió cardiovascular i pulmonar o la reacció toxicoal·lèrgica.

Les complicacions més greus són l'hemorràgia expulsiva i la infecció greu o panoftàlmia, que pot portar a la pèrdua del globus ocular.

Encara que és altament infreqüent, per les anàlisis que es realitzen és possible la transmissió de determinades malalties bacterianes, fúngiques, víriques com l'hepatitis, la SIDA o la malaltia de Creutzfeldt-Jacob.

## 8. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

Les patologies sistèmiques associades com la diabetis, la hipertensió, les cardiopaties, la immunodepressió i d'altres, augmenten el risc quirúrgic i la possibilitat de complicacions intraoperatòries i postoperatòries.

## Declaració de consentiment

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

DNI ..... SIP .....

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

En qualitat de (representant legal, familiar o acostatat del/de la pacient) ....., amb DNI .....

Declare:

Que el/la doctor/a ..... m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de .....

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: ..... DNI .....

Firmat: Dr/a ..... DNI .....

Col·legiat .....

## Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data ..... d ..... de 2 ....., i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat .....

