



1. Identificació i descripció del procediment

La timpanoplàstia és una intervenció que es realitza per a tractar l'origen i/o les seqüeles d'una otitis mitjana crònica. Consistix en la neteja de les cavitats de l'orella i la reconstrucció, si és possible, de la membrana timpànica i els ossets de l'orella mitjana.

Sol ser necessari actuar sobre les cavitats airejades de l'orella i del mastoide (zona òssia situada darrere de l'orella). En estes zones de l'orella és on pot aparéixer teixit epitelial de caràcter invasiu i originar la lesió denominada colesteatoma.

L'objectiu de la intervenció és doble: netejar la lesió que provoca la supuració i millorar, en la mesura que es puga, l'audició.

Per a accedir a l'orella afectada, la intervenció es realitza per mitjà d'incisió de la pell, habitualment per darrere del pavelló auricular. També sol ser necessària l'ampliació del conducte auditiu extern. La planificació del tractament de la malaltia de l'orella pot aconsellar la realització de dos intervencions. Una primera per a netejar les lesions i reconstruir el timpà, i una altra, al cap d'un temps, per a reconstruir la cadena dels ossets i així millorar l'audició.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Control del colesteatoma, de les complicacions d'origen infeccios i, en la mesura que es puga, millora de l'audició.

3. Alternatives raonables a este procediment

Revisions periòdiques per l'especialista, per a controlar la infecció.

Si no hi ha infecció, col·locació de pròtesis auditives, per a millorar l'audició.

És recomanable la utilització de taps d'orella durant el bany per a evitar la contaminació de l'orella mitjana, cosa que pot ajudar a previndre la infecció i les complicacions.

4. Conseqüències previsibles de la realització

Les conseqüències previsibles de la realització són:

.....

.....

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

La progressió és irregular, depenent de l'existència o no de colesteatoma.

Sense colesteatoma: sordesa i supuracions de repetició per sobreinfecció de l'orella mitjana que, excepcionalment, poden donar lloc a complicacions.

Amb colesteatoma: l'evolució normal comporta complicacions intratemporals (laberintitis i paràlisi facial) i endocranials (meningitis, tromboflebitis de grans sins dursals i abscessos extradural, subdural o intraparenquimatós cerebral o cerebel·lós).

6. Riscos freqüents

Els vitals són molt rars, encara que, com en tot acte mèdic i tenint en compte la necessitat d'anestèsia general en molts casos, se'n poden produir.

L'èxit de la reconstrucció i/o control de la supuració dependrà de la naturalesa i extensió de les lesions. I, encara que les possibilitats siguen altes, no sempre s'aconsegueix. En estos casos, pot ser necessària una reintervenció.

- Es pot produir una pèrdua d'audició respecte a l'audició prèvia a la intervenció, però passa molt rarament si la reconstrucció es limita al timpà.
- Si existixen prèviament sorolls d'orelles (acúfens) o marejos, estos poden persistir o fins i tot aparéixer després de la intervenció.

Intervenció de timpanoplàstia



ESPECIALITAT
D'OTORINOLARINGOLOGIA

- És molt poc freqüent la pèrdua de mobilitat del costat de la cara de l'orella intervinguda per afectació del nervi facial. Quan esta es produïx, sol ser passatgera, encara que també pot ser definitiva.
 - Ocasionalment, es produïx alteració del sentit del gust en el costat de la llengua de l'orella operada. Este és un xicotet inconvenient que millora en unes poques setmanes.
 - Altres complicacions inclouen: alteracions en la cicatrització amb afectació estètica del pavelló auditiu, hemorràgia, meningitis i altres complicacions endocranials que, encara que es poden produir, la probabilitat que apareguen és molt remota.
- Els processos crònics, complicats amb lesions extenses, presenten major risc terapèutic.

7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

Altres riscos o complicacions que podrien aparèixer, donada la seua situació clínica i les seues circumstàncies personals, són:

.....

.....

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostatat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat