



1. Identificació i descripció del procediment

Este tipus d'intervenció consistix en l'extirpació de la major part dels ganglis limfàtics del coll, d'un sol costat (unilateral) o dels dos (bilateral). Es practica, en general, com a part del tractament quirúrgic dels tumors malignes de l'àrea de cap i coll.

Este tipus d'operacions poden portar aparellada, amb fins terapèutics, l'extirpació de la vena jugular interna, el múscul esternocleidomastoide i la glàndula submaxil·lar.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Diagnòstic definitiu i curació del procés, en cas d'èxit de la intervenció.

3. Alternatives raonables a este procediment

Són alternatives, encara que amb efectivitat variable, la radioteràpia i la quimioteràpia.

4. Conseqüències previsibles de la realització

Les conseqüències previsibles de la realització són:

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En cas de tumors malignes de cap i coll, l'evolució sense tractament és sempre cap a la destrucció local i la mort del pacient, en un termini indeterminat. Es poden presentar complicacions durant l'evolució, que depenen de la localització tumoral.

6. Riscos freqüents

Els riscos vitals són poc freqüents, encara que, com en tot acte mèdic i tenint en compte la necessitat d'anestèsia general en tots els casos, se'n poden produir. Estos riscos vitals, tant intraoperatoris com postoperatoris, són els propis de qualsevol cirurgia major i estan íntimament relacionats amb l'edat, l'estat general i la patologia associada que presente el pacient. Les complicacions d'esta cirurgia inclouen:

- Hemorràgia aguda, que pot requerir transfusió.
- Infecció de la ferida, que necessitarà tractament amb antibiòtics.
- Complicacions cardiovasculars: trombosi venosa, embòlia pulmonar, etc.
- Complicacions derivades de l'estrés, com úlceres d'estómac.
- Hematomes o altres col·leccions líquides.

Com a conseqüència d'alguna d'estes complicacions, es pot prolongar l'estada hospitalària i ser necessari sotmetre el pacient a reintervencions.

Alguna d'estes complicacions pot ser molt greu i, fins i tot, comprometre la vida.

Els efectes secundaris que poden quedar després d'un buidament cervical ganglionar són els següents:

- Problemes en els moviments del múscle, la llengua i el llavi.
- Cicatriu i alteració estètica en l'àrea operatòria.
- Endormiscament i dolor en la zona operatòria.
- Unflor facial.

Intervenció de buidament cervical ganglionar

7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

Altres riscos o complicacions que podrien aparèixer, donada la seua situació clínica i les seues circumstàncies personals, són:

.....
.....

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprès adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat



ESPECIALITAT
D'OTORINOLARINGOLOGIA