



1. Identificación y descripción del procedimiento

Las amígdalas son masas de tejido linfoide que tienen la función de proteger al organismo de infecciones víricas o bacterianas. Igualmente pueden ser dañadas por microorganismos o crecer en exceso produciendo diversas alteraciones. Esta función inmunitaria se desarrolla en los primeros años de vida, pero es menos importante a medida que el niño crece.

Las amígdalas están situadas a ambos lados de la cavidad bucal, detrás de la lengua y suelen resultar visibles por la boca.

Llamamos amigdalectomía o tonsilectomía a la extirpación de las amígdalas

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

- Mejoría en la respiración.
- Disminución de infecciones de vías respiratorias altas.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

Dado que la cirugía se plantea ante el fracaso del tratamiento médico y las medidas higiénicas, no existe alternativa terapéutica.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Las consecuencias previsibles de su realización son.....

5. Consecuencias previsibles de su no realización

Dificultades respiratorias.

Deformidades del macizo facial con mal cierre dentario.

- Infecciones focales con posibilidades de afectación renal, cardíaca y reumática.

6. Riesgos

Riesgos derivados del uso de la Anestesia General.

El dolor que sigue a la cirugía es un efecto secundario, que puede ser razonablemente controlado con medicación. Es similar al dolor de los pacientes con infecciones faríngeas, pero es más frecuente su irradiación a los oídos en esta cirugía.

El sangrado postoperatorio puede aparecer en algunos casos; puede ocurrir en cualquier momento durante las dos primeras semanas, aunque lo más frecuente es que sea de inmediato tras la cirugía. El tratamiento del sangrado es usualmente un procedimiento ambulatorio, pero a veces requiere controlarse en el quirófano, bajo anestesia general. En raras ocasiones se precisa una transfusión sanguínea. En ocasiones se puede romper o perder alguna pieza dentaria.

A causa de que la deglución es dolorosa tras la cirugía, puede haber un escaso aporte de líquidos. Si no se puede corregir en el domicilio, el paciente debe ingresar en el Hospital para aporte de líquidos endovenosos.

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias personales, son.....

Intervención de amigdalectomía

9. Declaración de consentimiento

Don/doña de años de edad, con domicilio en , DNI y nº de SIP

Don/doña de años de edad, con domicilio en en calidad de (representante legal, familiar o allegado de la paciente) , con DNI

Declaro:

Que el Doctor/a me ha explicado que es conveniente/necesario, en mi situación la realización de y que he comprendido adecuadamente la información que me ha dado.

En a de de 2

Fdo.: Don / doña DNI

Fdo.: Dr/a DNI

Colegiado nº:

10. Revocación del consentimiento

Revoco el consentimiento prestado en fecha de de 2 y no deseo proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizado.

En a de de 2

Fdo. el médico

Fdo. el/la paciente

Colegiado nº:

