



1. Identificació i descripció del procediment

Consistix en una xicoteta intervenció per a col·locar la pròtesi en la zona d'estenosi de la uretra i solucionar el problema de dificultat o impossibilitat per a orinar. Es realitza amb un aparell d'endoscòpia, o radiològicament a través de la uretra, amb anestèsia local o regional.

Este tipus d'intervenció està especialment indicat en determinats malalts amb obstrucció urinària per estenosi d'uretra que van ser sotmesos a altres tractaments sense èxit.

La pròtesi és una malla cilíndrica d'un material biocompatible que, una vegada implantada en la zona de l'estenosi, s'expandix i amplia el calibre de la uretra estreta i s'incorpora progressivament el teixit de la mateixa uretra. També pot ser transitòria, per a facilitar la cicatrització d'una obertura quirúrgica de la uretra (uretrotomia).

El postoperatori és curt.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

La normalització de la micció.
Restituir la llum uretral per mitjà de la implantació de pròtesi.

3. Alternatives raonables a este procediment

Hi ha altres alternatives, com la uretrollàstia, la uretrotomia endoscòpica o la dilatació uretral.

4. Conseqüències previsibles de la realització

Les mencionades en els apartats 1 i 2 d'este document.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En la seua situació actual, el facultatiu considera la present indicació com la millor opció entre les possibles. No obstant això, i atés que ha rebut suficient informació, vosté és, en últim terme, lliure d'acceptar-la o no. En cas de no acceptar la present indicació, ha de saber que hi ha una elevada probabilitat de persistència i/o progressió de la simptomatologia per la qual va consultar o de les seues malalties prèvies. Les possibles complicacions que en un futur puguen succeir i el seu abast són, en bona part, imprevisibles, incloent-hi el risc vital.

6. Riscos

De la dita intervenció és possible, però no freqüent, esperar els següents efectes secundaris o complicacions:

- No aconseguir millora en la qualitat miccional. No aconseguir implantar la pròtesi.
- Simptomatologia de dolor i coentor a l'orinar, amb augment de freqüència, que sol durar uns dies.
- Durant l'acte quirúrgic poden produir-se hemorràgies, així com hematomes i edemes.
- Intolerància a la pròtesi o mobilització d'esta, la qual cosa implicarà en la majoria dels casos la seua retirada.
- Obstrucció de la llum de la pròtesi per la presència de càlculs o per creixement del teixit uretral, que pot requerir nova cirurgia.
- Infecció de la pròtesi, que portaria a la seua retirada i amb risc d'infecció generalitzada.
- Dolor perineal/penià durant l'erecció i/o ejaculació.

7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

És necessari que ens informe de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, renals, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància que pugua complicar la intervenció o agreujar el postoperatori.

Per la seua situació actual (diabetis, obesitat, immunodepressió, hipertensió, anèmia, edat avançada...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions, per la qual cosa el risc quirúrgic general és major.

Implantació de pròtesi en estenosi d'uretra

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua
situació, la realització de

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el
tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat



ESPECIALITAT D'UROLOGIA