



1. Identificació i descripció del procediment

És una exploració per mitjà de la qual, utilitzant un endoscopi, veiem l'interior de la bufeta i de la uretra. Es realitza habitualment en règim ambulatori i amb anestèsia local (gel anestèsic en la uretra), que minimitza les molèsties i les fa totalment tolerables.

Està indicada per a l'estudi de l'hematúria, cistitis de repetició, a vegades de l'adenoma de pròstata, així com per a les revisions després de la resecció de tumors vesicals. A vegades, es pot col·locar o retirar un catèter en l'urèter.

Abans de l'exploració o en el moment d'esta, se li donarà un antibiòtic per a profilaxi d'una possible infecció.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Per mitjà d'esta exploració podrem diagnosticar les causes de les seues molèsties i eliminar, si és el cas, esta causa, encara que l'objectiu fonamental és el diagnòstic.

3. Alternatives raonables a este procediment

Les exploracions radiològiques, ecogràfiques i analítiques són complementàries.

4. Conseqüències previsibles de la realització

L'obtenció d'un diagnòstic fiable.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En la seua situació actual, el facultatiu considera la present indicació com la millor opció entre les possibles. No obstant això, i atés que ha rebut suficient informació, vosté és, en últim terme, lliure d'acceptar-la o no. En cas de no acceptar la present indicació, ha de saber que hi ha una elevada probabilitat de persistència i/o progressió de la simptomatologia per la qual va consultar o de les seues malalties prèvies. Les possibles complicacions que en un futur puguen succeir i el seu abast són, en bona part, imprevisibles, incloent-hi el risc vital.

6. Riscos

De la dita intervenció és possible, però no freqüent, esperar els següents efectes secundaris o complicacions:

- No aconseguir arribar a un diagnòstic.
- Hemorràgia, tant durant l'acte quirúrgic com en el postoperatori. Les conseqüències de la dita hemorràgia poden ser molt diverses, depenent del tipus de tractament que es necessite.
- Síndrome de reabsorció líquida, a causa del transvasament inevitable del líquid d'irrigació al torrent sanguini. La seua producció és infreqüent.
- Infecció urinària o general, de conseqüències imprevisibles.

7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

És necessari que ens informe de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, renals, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància que pugua complicar la intervenció o agreujar el postoperatori.

Per la seua situació actual (diabetis, obesitat, immunodepressió, hipertensió, anèmia, edat avançada...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions, per la qual cosa el risc quirúrgic general és major.

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprès adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firat: DNI

Firat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firat: el/la metge/essa

Firat: el/la pacient

Col·legiat

