



## 1. Identificació i descripció del procediment

El tractament quirúrgic consisteix a tractar tumors benignes i malignes, litiasi de les glàndules, processos infecciosos i traumatisme d'estes. Les glàndules salivals es dividixen en majors (paròtide, submaxil·lar i sublingual) i menors, distribuïdes en tota la cavitat oral. La glàndula paròtide està íntimament relacionada amb la topografia del nervi facial, mentre que la submaxil·lar està relacionada amb el nervi lingual i hipoglòs. En la majoria dels casos, el procediment necessita anestèsia general, amb el risc inherent a esta.

## 2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Amb esta cirurgia es persegueix la resolució o millora del dolor causat per litiasi i l'eradicació del tumor benigne o maligne, o l'extirpació d'una de les glàndules danyades pel traumatisme.

S'espera una desaparició del dolor a causa de l'obstrucció causada per la litiasi o la infecció i una extirpació o resecció dels tumors benignes o malignes.

## 3. Alternatives raonables a este procediment

Només en el cas de la litiasi i la infecció, un tractament previ antibiòtic i sialogog podria donar algun benefici, mentre que en el cas dels tumors malignes o benignes i els traumatismes, no.

## 4. Conseqüències previsibles de la realització

Després d'un període de molèsties i incapacitat funcional cal esperar la desaparició parcial o total de la simptomatologia que presentava el pacient i, en cas de tumor maligne, una millora de la seua expectativa de vida.

## 5. Conseqüències previsibles de la no-realització

És molt probable que, depenent de la causa o la patologia de base, el pacient es quede amb la mateixa simptomatologia o que empitjore a causa d'un agreujament d'esta o d'una degeneració ulterior de la patologia maligna.

## 6. Riscos

A pesar de l'adequada elecció de la tècnica i de la correcta realització d'esta, es poden presentar efectes indesitjables. Segons la glàndula afectada, es poden presentar una sèrie de complicacions i seqüeles postoperatories que inclouen: dolor postoperatori, hemorràgia intraoperatoria o postoperatoria, infecció local postoperatoria, hematoma, inflamació o infecció de la glàndula paròtide o estructures adjacents, parèsia o paràlisi temporal o permanent del nervi facial, alteració de la sensibilitat d'àrees facials o orals, hipoestèsia o anestèsia del nervi lingual, parèsia o paràlisi del nervi hipoglòs, fistules salivals, síndrome de Frey, que es caracteritza per sudoració de la cara al menjar, hiposialosi...

## 7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

És necessari que el pacient advertisca de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, renals, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància que pugua complicar la intervenció o agreujar el postoperatori.

Per la situació vital actual del pacient (diabetis, obesitat, immunodepressió, hipertensió, anèmia, edat avançada...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions, per la qual cosa el risc quirúrgic general és major.

## Declaració de consentiment

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

DNI ..... SIP .....

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient) .....

....., amb DNI .....

Declare:

Que el/la doctor/a ..... m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de .....

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: ..... DNI .....

Firmat: Dr/a ..... DNI .....

Col·legiat .....

## Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data ..... d ..... de 2 ....., i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat .....

