

ANÁLISIS DUPLICIDAD TERAPÉUTICA SUBRUPO TERAPÉUTICO A13 - TÓNICOS

Clasificación ATC

A13A. – TÓNICOS Y RECONSTITUYENTES

A13AA. Tónicos

- Carnitina
- Otras asociaciones de tónicos
- Aspartato arginina

1.- Análisis duplicidad a nivel 4

La carnitina se emplea para el tratamiento de estados de agotamiento físico y mental. Únicamente existe una presentación farmacéutica de carnitina de modo que la asociación con ella misma se considera duplicidad terapéutica.

Las asociaciones de tónicos se emplean para el agotamiento físico y mental. Solo existe una presentación farmacéutica por lo que la asociación con ella misma se considera duplicidad terapéutica.

El aspartato arginina se emplea para la prevención y el tratamiento de determinados estados carenciales de aminoácidos (estress, convalecencia e inadecuado aporte en la ingesta). Existen dos presentaciones farmacéuticas de este principio activo, comprimidos y ampollas, pero ambos comparten indicaciones de modo que su asociación se considera duplicidad.

La asociación entre diferentes principios activos del subgrupo terapéutico A13AA se considera duplicidad debido a que comparten indicaciones y no requieren su asociación para alcanzar dosis terapéuticas.

