

ANÁLISIS DUPLICIDAD TERAPÉUTICA SUBGRUPO TERAPÉUTICO D11 – OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS

Clasificación ATC

D11A Otros preparados dermatológicos

D11AC Champús medicinales

Zinc piritionato
Zinc piritionato + brea de hulla
Brea de hulla
Selenio sulfato
Selenio + benzalconio
Povidona yodada
Aceite de cacahuete + brea vegetal + enebro + brea hulla
Brea hulla + ácido salicílico

D11AE Andrógenos de uso tópico

Testosterona propionato (Fórmula magistral)

D11AF Antiverrugas y callicidas

Ácido salicílico
Ácido salicílico + ácido acético
Ácido salicílico + ácido láctico
Ácido salicílico + benzocaína
Yodo tintura + quelidonio alcoholatura + ácido salicílico + tuya tintura +
ácido acético
Ácido salicílico + ácido láctico + ácido acético + aceite de ricino
Ácido salicílico + alcánfor

D11AH Agentes para dermatitis atópica excluyendo corticosteroides

Tacrolimus
Pimecrolimus
Alitretinoína

D11AX Otros dermatológicos

Minoxidilo

Finasterida

Hidroquinona

Zinc piritionato

Diclofenaco

Cistina

Hamamelis

Hierro magnesio + sulfanilamida + brea + plomo

Centella asiática


Asociación de tónicos (fitato calcico magnesico + cianocobalamina
+levoglutamida + piridoxina + tiamina)

Apósito reductor de cicatrices

Ácidos grasos

1.- Análisis de la duplicidad a nivel 4 de la ATC

El subgrupo D11AC corresponde a champuses medicinales. Están indicados para el tratamiento de la dermatitis seborreica, caspa, descamación y prurito del cuero cabelludo. Excepto la povidona yodada, que se emplea como desinfectante de zonas pilosas del cuerpo y por lo tanto si que se puede prescribir junto al resto de principios activos del grupo.



Entre los distintos subgrupos no vamos a encontrar duplicidades, ya que cada uno de ellos posee unas indicaciones totalmente diferentes a las del resto. Tan sólo recalcar que debe evitarse en todo caso el uso de distintos productos tópicos sobre la misma lesión.

El subgrupo D11AC corresponde a los champús medicinales, mientras que el subgrupo D11AF corresponde a preparados anti- verrugas y callicidas. Su uso concomitante no llevaría a duplicidad.

D11AC	+	D11AF	→	
CETRIMIDA COMPUESTOS DE CADMIO COMPUESTO DE SELENIO BREA DE HULLA BREA DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO BREA DE HULLA + ACEITE DE ENEBRO + ACEITE DE CACAHUETE + ALQUITRÁN PINO BREA DE HULLA + BREA VEGETAL + ACEITE DE CACAHUETE + ENEBRO POVIDONA YODADA		ÁCIDO SALICÍLICO ÁC. SALICÍLICO + BENZOCAÍNA ÁC. SALICÍLICO + ÁCIDO LÁCTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ÁCIDO ACÉTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ALCANFOR ÁCIDO SALICÍLICO + YODO TINTURA + QUELIDONIO + TUYA ALCOHOLATURA + ÁCIDO ACÉTICO		NO DUPLICIDAD

El subgrupo D11AC corresponde a los champús medicinales, mientras que el subgrupo D11AH comprende principios activos indicados en el tratamiento de la dermatitis atópica. Su uso concomitante no llevaría a duplicidad.

D11AC	+	D11AH	→	
CETRIMIDA COMPUESTOS DE CADMIO COMPUESTO DE SELENIO BREA DE HULLA BREA DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO BREA DE HULLA + ACEITE DE ENEBRO		TACROLIMUS PIMECROLIMUS		NO DUPLICIDAD

+ ÁCIDO LÁCTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ÁCIDO ACÉTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ALCANFOR ÁCIDO SALICÍLICO + YODO TINTURA +QUELIDONIO + TUYA ALCOHOLATURA + ÁCIDO ACÉTICO	+	+ ÁCIDO LÁCTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ÁCIDO ACÉTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ALCANFOR ÁCIDO SALICÍLICO + YODO TINTURA +QUELIDONIO + TUYA ALCOHOLATURA + ÁCIDO ACÉTICO	→	DUPLICIDAD
---	---	---	---	------------

Los principios activos del subgrupo D11AF tienen indicaciones diferentes a los del subgrupo D11AH (indicados en el tratamiento de la dermatitis atópica), por lo que su administración concomitante no llevaría a duplicidad.

D11AF	+	D11AH	→	NO DUPLICIDAD
ÁCIDO SALICÍLICO ÁC. SALICÍLICO + BENZOCAÍNA ÁC. SALICÍLICO + ÁCIDO LÁCTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ÁCIDO ACÉTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ALCANFOR ÁCIDO SALICÍLICO + YODO TINTURA +QUELIDONIO + TUYA ALCOHOLATURA + ÁCIDO ACÉTICO		TACROLIMUS PIMECROLIMUS ALITRETINOINA		

El subgrupo D11AF corresponde a anti- verrugas y callicidas, mientras que el subgrupo D11AX comprende principios activos indicados en el tratamiento de distintas patologías que no están relacionadas con este tipo de lesiones. Su uso concomitante no lleva a duplicidad. Tan sólo recalcar que debe evitarse en todo caso el uso de distintos productos tópicos sobre la misma lesión.

D11AF	+	D11AX	→	NO DUPLICIDAD
ÁCIDO SALICÍLICO ÁC. SALICÍLICO + BENZOCAÍNA ÁC. SALICÍLICO + ÁCIDO LÁCTICO ÁCIDO SALICÍLICO		MINOXIDILO MEQUINOL HIDROQUINONA FINASTERIDA		

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

+ ÁCIDO ACÉTICO ÁCIDO SALICÍLICO + ALCANFOR ÁCIDO SALICÍLICO + YODO TINTURA + QUELIDONIO + TUYA ALCOHOLATURA + ÁCIDO ACÉTICO	EFLORNITINA DICLOFENACO tópico HAMAMELIS ASOCIACIÓN DE TÓNICOS APÓSITO REDUCTOR DE CICATRICES ÁCIDOS GRASOS	
---	---	--

Dentro del subgrupo D11AH, los principios activos tacrolimus y pimecrolimus, de uso tópico, están indicados en el tratamiento de la dermatitis atópica y poseen el mismo mecanismo de acción, por lo que si se emplean dos de estos principios se daría una duplicidad. Pero el principio activo Tretinoína posee distinto mecanismo de acción y además es de administración oral, por lo que su uso junto a uno de los principios activos anteriores no supondría duplicidad.

D11AH TACROLIMUS PIMECROLIMUS	+	D11AH TACROLIMUS PIMECROLIMUS	→	DUPLICIDAD
ALITRETINOINA	+	ALITRETINOINA	→	DUPLICIDAD
TACROLIMUS PIMECROLIMUS	+	ALITRETINOINA	→	NO DUPLICIDAD

El subgrupo D11AH está indicado en el tratamiento de la dermatitis atópica, mientras que el subgrupo D11AX comprende principios activos indicados en el tratamiento de distintas patologías que no están relacionadas con la dermatitis. Por lo que el uso conjunto de principios activos de los distintos grupos no sería duplicidad.

D11AH	D11AX MINOXIDILO
--------------	----------------------------

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris


<p>TACROLIMUS</p> <p>PIMECROLIMUS</p> <p>ALITRETINOINA</p>	+	<p>MEQUINOL</p> <p>HIDROQUINONA</p> <p>FINASTERIDA</p> <p>EFLORNITINA</p> <p>DICLOFENACO tópico</p> <p>HAMAMELIS</p> <p>ASOCIACIÓN DE TÓNICOS</p> <p>APÓSITO REDUCTOR DE CICATRICES</p> <p>ÁCIDOS GRASOS</p>	→	<p>NO DUPLICIDAD</p>
--	---	--	---	----------------------

El subgrupo D11AX Otros preparados dermatológicos está compuesto por una serie de principios activos cada uno de ellos con una indicación diferente, por lo que no vamos a encontrar duplicidades entre los distintos principio activo. A nivel de principio activo se considera duplicidad combinar dos principios activos iguales.

D11AX		D11AX		
MINOXIDILO	+	MINOXIDILO	→	DUPLICIDAD
FINASTERIDA	+	FINASTERIDA	→	DUPLICIDAD
HIDROQUINONA	+	HIDROQUINONA	→	DUPLICIDAD
DICLOFENACO tópico	+	DICLOFENACO tópico	→	DUPLICIDAD
ZINC PIRITONATO	+	ZINC PIRITONATO	→	DUPLICIDAD
HAMAMELIS	+	HAMAMELIS	→	DUPLICIDAD
CISTINA	+	CISTINA	→	DUPLICIDAD
HIERRO MAGNESIO+SULFANILAMID A+BREA+PLOMO	+	HIERRO MAGNESIO+SULFANILAMID A+BREA+PLOMO	→	DUPLICIDAD
CENTELLA ASIÁTICA	+	CENTELLA ASIÁTICA	→	DUPLICIDAD
ASOCIACION DE TÓNICOS	+	ASOCIACION DE TÓNICOS	→	DUPLICIDAD
APÓSITO REDUCTOR DE CICATRICES	+	APÓSITO REDUCTOR DE CICATRICES		DUPLICIDAD
ÁCIDOS GRASOS	+	ÁCIDOS GRASOS		DUPLICIDAD

La administración conjunta de Minoxidilo y Finasterida está indicada en el tratamiento de la alopecia androgenética. Tienen la misma indicación pero distintos mecanismos de acción, por lo que se potencian sus efectos.

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris



Bibliografía:

- Catálogo de Medicamentos 2009. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Fichas técnicas Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
- BOT PLUS.

Revisión:

- Validado por la Dra. Laura Mahiques, especialista del servicio de Dermatología del Hospital de Manises.