

ANÁLISIS DUPLICIDAD TERAPÉUTICA SUBGRUPO TERAPÉUTICO H02 – CORTICOIDES USO SISTÉMICO

Clasificación ATC

H02A – CORTICOIDES DE USO SISTÉMICOS, SOLOS

H02AA - Mineralcorticoides

Fludrocortisona

H02AB - Glucocorticoides

Triamcinolona
Prednisona
Prednidolona
Metilprednisolona
Hidrocortisona
Dexametasona
Deflazacort
Betametasona

H02B – CORTICOIDES DE USO SISTÉMICO EN ASOCIACIÓN

A10BX – Corticosteroides de uso sistémico en asociación

Clemastina + dexametasona
Betametasona + Dexclorfeniramina

1.- Análisis duplicidad a nivel 4 de la ATC

No tiene sentido la administración conjunta de dos o más fármacos del mismo subgrupo terapéutico, siempre que no se tengan que administrar juntos para ajustar dosis (Dexametasona, Deflazacort, Prednisona y metilprednisolona).

En el caso del subgrupo H02AB es posible la asociación entre prednisona, prednisolona y dexametasona en el tratamiento de cáncer de próstata ya que en los ciclos de quimioterapia se combinan estos 3 medicamentos.


También sería posible la combinación de prednisona con hidrocortisona en el caso de prescribirlos para determinados momentos del día, es decir, la prednisona al tener vida media más larga sería más adecuada para administrarla por la noche, y la hidrocortisona para el día.

H02AA Fludrocortisona	+	H02AA Fludrocortisona	DUPLICIDAD
H02AB Triamcinolona Prednisona Prednisolona Metilprednisolona Hidrocortisona Dexametasona Deflazacort Betametasona	+	H02AB Triamcinolona Prednisona Prednisolona Metilprednisolona Hidrocortisona Dexametasona Deflazacort Betametasona	DUPLICIDAD
H02AB Prednisona	+	H02AB Hidrocortisona	INDICADO
H02AB Prednisona Prednisolona Dexametasona	+	H02AB Prednisona Prednisolona Dexametasona	INDICADO
H02BX Clemastina + dexametasona Betametasona + dexclorfeniramina	+	H02BX Clemastina + dexametasona Betametasona + dexclorfeniramina	DUPLICIDAD


2.- Anàlisis duplicidad a nivel 3 de la ATC

No es lógic administrat dos o més fàrmacs entre subgrups terapèutics a nivell 3, salvo alguna excepció.

No se debe pautar un fàrmac del subgrup H02AA de acció mineralocorticoide, con un fàrmac del subgrup H02AB de acció glucocorticoide.




Estaría justificada esta asociación en "La insuficiencia suprarrenal primaria o en la Hiperplasia adrenal congénita pierde sal"



3.- Anàlisis duplicidad a nivel 2

La administració conjunta de un fàrmac del subgrup H02A (ya sea mineralocorticoide como glucocorticoide), junto con un fàrmac del subgrup H02B, no tiene sentido darla, por tanto se considera duplicidad.



Revisión:

- Servicio de Medicina Interna HGUA. Departamento de Alicante Hospital-General.
- Servicio de Endocrinología HGUA. Departamento de Alicante Hospital-General.
- Farmacéutica Área de salud. Departamento de Alicante Hospital-General.
- Farmacia Área del Departamento de San Juan- Alicante.
- Validado por la Comisión de Uso Racional del Medicamento (CURM)