

ANÁLISIS DE DUPLICIDAD TERAPÉUTICA DEL SUBGRUPO TERAPÉUTICO: M02 - PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR

CLASIFICACIÓN ATC

M02A PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR

M02AA ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS PARA USO TÓPICO

PIROXICAM
PIKETOPROFENO
INDOMETACINA
IBUPROFENO
KETOPROFENO
ASOCIACIONES FENILBUTAZONA
FEPRADINOL
MABUPROFENO
ACECLOFENACO
BENCIDAMIDA
DEXKETOPROFENO
DICLOFENACO
ETOFENAMATO
FELBINACO (no visible ni prescribable)

M02AB PREPARADOS CON CAPSAICINA Y AGENTES SIMILARES

CAPSAICINA

M02AC PREPARADOS CON DERIVADOS DEL ÁCIDO SALICÍLICO

DERIVADOS ÁCIDO SALICÍLICO + OTROS

SALICILATO DIETILAMINA + CINEOL

SALICILATO METILO + ISONIXINO

SALICILATO DIETILAMINA + MIRTECAÍNA

SALICILATO DIETILAMINA + CASTAÑO DE INDIAS

TROLAMINA SALICILATO

M02AX OTROS PRODUCTOS TÓPICOS PARA DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR

ALCANFOR

PREPARADOS CON SALICILATOS

ROMERO

1.- Análisis de duplicidades a nivel 4 de la ATC

M02AA ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR

SUBGRUPO M02AA		SUBGRUPO M02AA	
Piroxicam		Piroxicam	
Piketoprofeno		Piketoprofeno	
Indometacina		Indometacina	
Suxibuzona		Suxibuzona	
Ibuprofeno	+	Ibuprofeno	DUPLICIDAD
Ketoprofeno		Ketoprofeno	
Asoc.Fenilbutazona		Asoc.Fenilbutazona	
Fepradinol		Fepradinol	
Mabuprofeno		Mabuprofeno	
Aceclofenaco		Aceclofenaco	
Bencidamida		Bencidamida	
Dexketoprofeno		Dexketoprofeno	
Diclofenaco		Diclofenaco	
Etofenamato		Etofenamato	
Felbinaco		Felbinaco	

Todos estos principios activos son antiinflamatorios y analgésicos no esteroideos que actúan impidiendo la síntesis de prostaglandinas y otros prostanoides mediante la inhibición de la ciclooxigenasa que interviene en procesos inflamatorios.

Los principios activos del subgrupo M02AA presentan mismo mecanismo de acción e indicaciones, además de existir contraindicación, de modo de combinarlos entre ellos sería duplicidad terapéutica.

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Aunque las concentraciones séricas que se alcanzan con la administración tópica son muy bajas está contraindicado el uso conjunto de varios AINES porque se puede potenciar el riesgo de úlceras y hemorragias gastrointestinales debido a un efecto sinérgico.

Todos los principios activos están indicados para el alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias , de origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos (artritis, periartrosis, capsulitis, tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de rodilla, contracturas, tendinitis, bursitis, contusion, esguince, lumbalgia, tortícolis).

M02AB PREPARADOS CON CAPSAICINA Y AGENTES SIMILARES

SUBGRUPO M02AB		SUBGRUPO M02AB
Capsaicina	+	Capsaicina
DUPLICIDAD		

La capsaicina se utiliza para el alivio sintomático de Mialgia y del dolor osteomuscular localizado. Se encuentra en forma de parches y crema no estando indicado utilizar el apósito conjuntamente con otros productos para el dolor , de modo que sería duplicidad terapéutica administrar el mismo principio activo en forma de crema y en apósitos.

M02AC PREPARADOS CON DERIVADOS DEL ÁCIDO SALICÍLICO

<u>SUBGRUPO M02AC</u>		<u>SUBGRUPO M02AC</u>
Derivados ácido salicílico+otros		Derivados ácido salicílico+otros
Salicilato dietilamina+cineol		Salicilato dietilamina+cineol
Salicilato metilo + isonixino	+	Salicilato metilo + isonixino
Salicilato dietilamina + mirtecaína		Salicilato dietilamina + mirtecaína

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Salicilato dietilamina + castaño de indias
castaño de indias

Salicilato dietilamina +

Trolamina salicilato

Trolamina salicilato

Los principios activos del subgrupo M02AC tienen las mismas indicaciones: artritis, capsulitis, artrosinovitis, tendinitis, bursitis, tortícolis, lumbalgia, contusión, esguince, contractura.

No es recomendable la aplicación simultánea varios medicamentos de uso cutáneo que contengan analgésicos y rubefacientes porque se puede producir una potenciación de los efectos, de modo que sería una duplicidad terapéutica administrarlos conjuntamente.

M02AX OTROS PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR

SUBGRUPO M02AX

SUBGRUPO M02AX

Alcanfor

Alcanfor

Preparados con salicilatos

+

Preparados con salicilatos

DUPLICIDAD

Romero

Romero

Las sustancias del subgrupo M02AX tienen las mismas indicaciones de modo que sería duplicidad terapéutica administrarlas conjuntamente. Está contraindicado el uso simultáneo de varios rubefacientes por efectos aditivos.

El alcohol alcanforado es un rubefaciente y analgésico débil indicado para aliviar los dolores musculares o articulares.

El alcohol de romero es un rubefaciente indicado también para tratamiento de los dolores musculares y los preparados con salicilatos combinan el salicilato de metilo, alcanfor, mentol, esencia de trementina con acciones antiinflamatorias, analgésicas y rubefacientes.

2.- Anàlisis de duplicidades a nivel 3 de la ATC

SUBGRUPO M02AA		SUBGRUPO M02AB	
Piroxicam	+	Capsaicina	DUPLICIDAD*
Piketoprofeno			
Indometacina			
Suxibuzona			
Ibuprofeno			
Ketoprofeno			
Asoc.Fenilbutazona			
Fepradinol			
Mabuprofeno			
Aceclofenaco			
Felbinaco			
Bencidamida			
Dexketoprofeno			
Diclofenaco			
Etofenamato			

No es recomendado el uso de capsaicina junto con otros productos tópicos ya sean rubefacientes o geles para el alivio del dolor. Aunque los principios activos del M02AA tienen distinto mecanismo de acción que la capsaicina consideramos que para una misma indicación sería duplicidad administrar los dos conjuntamente.

En caso que el paciente tuviera varios dolores en distintas partes del cuerpo estaría indicado prescribirlos conjuntamente ya que la capsaicina se suele mandar más para dolores muy localizados y en zonas pequeñas debido al escozor y picor que produce.

SUBGRUPO M02AA		SUBGRUPO M02AC	
Piroxicam	+	Derivados ac.salicilico + otros	DUPLICIDAD
Piketoprofeno		Salicilato dietilamina+cineol	
Indometacina		Salicilato metilo + isonixino	
Suxibuzona		Salicilato dietilamina + mirtecaína	
Ibuprofeno		Salicilato dietilamina + castaño indias	
Ketoprofeno		Trolamina salicilato	
Asoc.Fenilbutazona			
Fepradinol			
Mabuprofeno			
Aceclofenaco			
Felbinaco			
Bencidamida			
Dexketoprofeno			
Diclofenaco			
Etofenamato			

Los principios activos de los subgrupos M02AA y M02AC presentan las mismas indicaciones y similares mecanismos de acción de modo que se considera duplicidad administrarlos conjuntamente, además no es recomendable la aplicación de varios medicamentos de uso cutáneo que contengan analgésicos y rubefacientes porque se puede producir una potenciación del efecto.

Además el ácido salicílico puede incrementar la absorción de otros medicamentos aplicados tópicamente en el área de aplicación.

En el caso que pasaran a circulación sistémica por utilizarlos en zonas amplias con mucha cantidad o al utilizar vendajes se podrían producir hemorragias gastrointestinales o úlceras, de modo que está contraindicado administrar conjuntamente un principio activo del subgrupo M02AA con uno del M02AC.

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

SUBGRUPO M02AC

SUBGRUPO M02AB

Derivados ac.salicilico+otros	+	Capsaicina	DUPLICIDAD
Salicilato dietilamina+cineol			
Salicilato metilo+isonixio			
Salicilato dietilamina+mirtecaína			
Salicilato dietilamina+castaño de indias			
Trolamina salicilato			

Aunque tienen distintos mecanismos de acción los principios activos del subgrupo M02AC respecto de la capsaicina las indicaciones son las mismas y siempre que sea para una misma indicación sería duplicidad la aplicación conjunta de estos subgrupos de fármacos.

Revisión:

Análisis revisado por el traumatólogo Felipe Hermosilla Sanchez del Hospital de Vinalopó.