

ANÁLISIS DUPLICIDAD TERAPÉUTICA SUBRUPO TERAPÉUTICO M09 – OTRAS DROGAS PARA DESÓRDENES DEL SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO

Clasificación ATC

M09A OTRAS DROGAS PARA DESÓRDENES DEL SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO

M09AB ENZIMAS

Clostridium Hystolicum

M09AX OTRAS DROGAS PARA DESÓRDENES DEL SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO

Uridina trifosfato
Ácido hialurónico
Hialuronato sódico
Condrocitos autologos (Uso hospitalario)

1.- Análisis duplicidad a nivel 4

El principio activo Clostridium Hystoliticum se emplea para el tratamiento de la contractura de Dupuytren en pacientes adultos que presenten cuerda palpable. La administración conjunta del mismo principio activo se considera duplicidad.

SUBGRUPO M09AB Clostridium Hystoliticum	+	SUBGRUPO M09AB Clostridium Hystoliticum	DUPLICIDAD
--	---	--	------------

Tanto el ácido hialurónico como el hialuronato sódico se emplean para el tratamiento sintomático del dolor y de la función articular en la artrosis de rodilla. La administración conjunta de ambos se considera duplicidad ya que la pauta es de 1 jeringa precargada una vez a la semana, por lo que no tiene sentido prescribirlo 2 veces.

SUBGRUPO M09AX Ácido hialurónico Hialuronato sódico	+	SUBGRUPO M09AX Ácido hialurónico Hialuronato sódico	DUPLICIDAD
---	---	---	------------

La uridina trifosfato se emplea para el tratamiento de las neuropatías de origen osteoarticular (ciática, radiculitis, etc.), metabólico (polineuritis diabética, alcohólica, etc.), infeccioso (herpes zóster) y a frigore, para la neuralgia del facial, trigémino, intercostal y lumbago. No tiene sentido administrarlo 2 veces, por lo que se considera duplicidad.

SUBGRUPO M09AX Uridina trifosfato	+	SUBGRUPO M09AX Uridina trifosfato	DUPLICIDAD
--------------------------------------	---	--------------------------------------	------------


La administración de condrocitos autologos se emplea en la reparación de lesiones sintomáticas del cartílago del cóndilo femoral de la rodilla en adultos. No tiene sentido administrarlo 2 veces, por lo que se considera duplicidad.

SUBGRUPO M09AX Condrocitos autologos	+	SUBGRUPO M09AX Condrocitos autologos	DUPLICIDAD
---	---	---	------------

La administración de uridina fosfato con ácido hialurónico, hialuronato sódico o condorcitos autologos no se considera duplicidad ya que las indicaciones son diferentes.

SUBGRUPO M09AX Hialuronato sódico Ácido hialurónico Condrocitos autologos	+	SUBGRUPO M09AX Uridina trifosfato	INDICADO
--	---	--------------------------------------	----------

2.- Análisis duplicidad a nivel 3



Las indicaciones de los principios activos de ambos subgrupos son diferentes por lo que su administración conjunta no se considera duplicidad.