

ANÁLISIS DUPLICIDAD TERAPÉUTICA SUBGRUPO TERAPÉUTICO N06 – PSICOANALÉPTICOS

Clasificación ATC

N06A – Antidepresivos

N06AA: INHIB. NO SELECTIVOS DE LA RECAPTACION MONOAMINAS ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS Y AFINES

Maprotilina
Trimipramina
Amitriptilina
Dosulepina
Doxepina
Clomipramina
Imipramina
Nortriptilina

N06AB: INHIB. SELECTIVOS RECAPTACION SEROTONINA (ISRS)

Sertralina
Escitalopram
Fluoxetina
Paroxetina
Fluvoxamina
Citalopram

N06AF: INHIB. NO SELECTIVOS DE LA MONOAMINOXIDASA

Tranilcipromina

N06AG: INHIB. MONOAMINO-OXIDASA TIPO A (ANTIDEPRESIVOS IMAO A

Moclobemida

N06AX: OTROS ANTIDEPRESIVOS

Mianserina
Reboxetina
Agomelatina
Mirtazapina
Bupropion
Venlafaxina
Duloxetina
Oxitriptan
Trazodona
Desvenlafaxina
Tianeptina
Vortioxetina

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

N06B-Psicoestimulantes y Nootròpicos

N06BA: SIMPATICOMIMETICOS ACCION CENTRAL

Modafinilo
Metilfenidato
Atomoxetina
Dexanfetamina
Metilfenidato clorhidrato
Lisdexanfemamina

N06BC: DERIVADOS DE LAS XANTINAS (PSICOESTIMULANTES)

Cafeína

N06BX: OTROS PSICOESTIMULANTES Y NOOTROPICOS

Vinpocetina
Citicolina
Pirisudanol
Piracetam
Hipérico
Deanol+Heptaminol
G - Aminobutírico ácido + Glutamato magnésico + Piridoxina

N06C-Psicolepticos y Psicoanalepticos

N06CA: ANTIDEPRESIVOS EN COMBINACION CON PSICOLEPTICOS

Perfenacina+Amitriptilina
Nortriptilina+Diazepam
Amitriptilina+Medazepam
Melitraceno+Flupentixol

N06D-FARMACOS ANTI-DEMENCIA

N06DA: ANTICOLINESTERASAS (MEDICAMENTOS CONTRA DEMENCIA)


Donepezilo
Galantamina
Rivastigmina

N06DX: OTROS MEDICAMENTOS ANTI-DEMENCIA


Memantina
Ginkgo biloba

1.- Análisis de duplicidades a nivel 4 de la ATC

Las presentaciones farmacéuticas de los principios activos existentes en el mercado de los subgrupos terapéuticos N06BX y N06DA son adecuadas para administrar las dosis que se recomiendan en las fichas técnicas, y no requieren de una combinación de varias de ellas. Por tanto, se considera duplicidad, tanto la asociación entre diferentes principios activos de los dos subgrupos terapéuticos como la administración concomitante de dos presentaciones farmacéuticas del mismo principio activo ya que no hay evidencia científica de que la asociación de ambos beneficie al paciente.



En el caso del subgrupo N06DA la asociación es excluyente, es decir, los principios activos de este subgrupo son prácticamente iguales, de modo que solo tiene sentido la prescripción de uno de ellos, por tanto su asociación se considera duplicidad.




A nivel de principio activo se permite asociar presentaciones farmacéuticas diferentes únicamente de la rivastigmina necesarias para alcanzar la dosis terapéutica.

La asociación entre diferentes principios activos y la asociación de diferentes presentaciones farmacéuticas del mismo principio activo de los subgrupos terapéuticos N06AA, N06AB, N06AF, N06AG, N06AX, N06BA, N06BC, N06CA y N06DX no se considera duplicidad debido a que puede ser necesaria su asociación para alcanzar las dosis terapéuticas.

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

N06AA MAPROTILINA TRIMIPRAMINA AMITRIPTILINA DOSULEPINA DOXEPINA CLOMIPRAMINA IMIPRAMINA NORTRIPTILINA	+	N06AA MAPROTILINA TRIMIPRAMINA AMITRIPTILINA DOSULEPINA DOXEPINA CLOMIPRAMINA IMIPRAMINA NORTRIPTILINA
N06AB SERTRALINA ESCITALOPRAM FLUOXETINA PAROXETINA FLUVOXAMINA CITALOPRAM	+	N06AB SERTRALINA ESCITALOPRAM FLUOXETINA PAROXETINA FLUVOXAMINA CITALOPRAM
N06AG MOCLOBEMIDA	+	N06AG MOCLOBEMIDA
N06AX MIANSERINA REBOXETINA AGOMELATINA MIRTAZAPINA BUPROPION VENLAFAXINA DULOXETINA OXITRIPTAN TRAZODONA DESVENLAFAXINA TIANEPTINA VORTIOXETINA	+	N06AX MIANSERINA REBOXETINA AGOMELATINA MIRTAZAPINA BUPROPION VENLAFAXINA DULOXETINA OXITRIPTAN TRAZODONA DESVENLAFAXINA TIANEPTINA VORTIOXETINA

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris



2.- Análisis de duplicidades a nivel 3 de la ATC

La asociación entre los principios activos de los subgrupos terapéuticos N06AA, N06AB, 06AF, N06AG y N06AX, no se considera duplicidad.

La asociación entre los principios activos de los subgrupos terapéuticos N06BA, N06BC y N06BX, no se considera duplicidad.


La asociación entre los principios activos de los subgrupos terapéuticos N06DA y N06DX, no se considera duplicidad.

3.- Análisis de duplicidades a nivel 2 de la ATC

La asociación entre los principios activos de los diferentes subgrupos terapéuticos no se considera duplicidad salvo la asociación de los siguientes subgrupos:

La asociación entre principios activos de los subgrupos terapéuticos N06AF y N06BA se considera duplicidad debido a que la administración concomitante da lugar a crisis hipertensivas graves.

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris



La asociación de un principio activo del subgrupo N06BX con memantina (N06DX) se considera duplicidad debido a que no hay evidencia científica de que dicha asociación beneficie al paciente.

Igualmente, la asociación de un principio activo del subgrupo N06BX con ginkgo biloba (N06DX) se considera duplicidad debido a que son muy parecidos y por tanto, no tendría sentido su asociación.

