



## 1. Identificació i descripció del procés

La cesària és una intervenció quirúrgica que s'utilitza per a finalitzar un embaràs o part quan hi ha causes maternes, fetals o ovulars que desaconsellen el part vaginal. Consistix en l'obertura de l'úter i la posterior extracció del seu contingut. Per a arribar a l'úter s'ha de realitzar una intervenció quirúrgica que travessa diverses estructures.

La intervenció requereix l'administració d'anestèsia, i és possible que durant la intervenció o després d'esta siga necessària la utilització de sang i/o hemoderivats. El tipus d'anestèsia (general o locoregional) es decidirà en el moment d'iniciar la intervenció.

A vegades l'extracció fetal es facilita aplicant un vacuoextractor que deixa la corresponent marca passatgera.

## 2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Per mitjà d'este procediment es pretén el naixement del fetus per la forma que cause menys perjudicis a ell i a la mare, és a dir, es busca la màxima seguretat per a ambdós.

## 3. Alternatives raonables a este procediment

Segons els conceptes actuals de la perinatologia, este és el procediment menys lesiu i el que produïx millors resultats tant quod vitam com quod funcionem en l'assistència al part, per als dos subjectes implicats en el procediment.

## 4. Conseqüències previsibles de la realització

No està exempta d'uns riscos raonables, ja que en esta intervenció s'unixen un part (es tracta d'una modalitat de part) i una intervenció quirúrgica. Segons el tipus d'accés quirúrgic serà la cicatriu que deixe (horitzontal o vertical); això només es decidix en el moment de començar la intervenció.

## 5. Conseqüències previsibles de la no-realització

Mal resultat perinatal i matern (com s'ha pogut veure en els seguiments a llarg termini), que poden arribar a la lesió permanent del cervell o fins i tot a la mort del fetus o del noutat i a la incapacitació social de la dona. En alguns casos extrems és impossible (mecànicament parlant) el part per via vaginal.

## 6. Riscos freqüents

A pesar de l'adequada elecció de la tècnica i de la correcta realització, l'ús de la cesària pot presentar efectes indesitjables derivats del fet que amb esta es resol un part, com ara:

- Hemorràgia, atonia uterina, endometritis.

Atès que és un procediment quirúrgic, també pot produir complicacions com ara:

- Febra, infecció de la ferida, seromes i hematomes, afeccions de vies urinàries, dehiscència o eventració postquirúrgica.

## 7. Riscos poc freqüents

Ocasionalment poden presentar efectes més greus, com el trastorn de la coagulació sanguínia (CID) i infecció generalitzada. S'ha de tindre present que els riscos són més freqüent com menor és la seua gravetat, la qual cosa significa que quadros com la CID o la infecció generalitzada són molt rars.

## 8. Riscos en funció de la situació personal del pacient

La pacient ha d'advertir de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions que estiga rebent o qualsevol altra circumstància que afecte la seua salut.

Per la situació vital actual del pacient (diabetis, obesitat, hipertensió, anèmia, edat, etc.), es pot veure augmentada la freqüència o la gravetat dels riscos o complicacions descrits anteriorment.

## Declaració de consentiment

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

DNI ..... SIP .....

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

En qualitat de (representant legal, familiar o acostatat del/de la pacient) ....., amb DNI .....

Declare:

Que el/la doctor/a ..... m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de .....

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: ..... DNI .....

Firmat: Dr/a ..... DNI .....

Col·legiat .....

## Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data ..... d ..... de 2 ....., i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat .....

