



1. Identificació i descripció del procediment

Esta intervenció consistix en una reparació quirúrgica per a construir un penis *normal*, consistent en una estirada del penis, amb reposició del meat, i la reconstrucció d'una uretra de calibre uniforme. Té tres objectius: millora estètica, miccional i de l'erecció.

Esta intervenció pot realitzar-se amb anestèsia general, regional o local. La tècnica quirúrgica pot ser molt variada, depenent de la localització del meat hipospàdic, de les condicions del teixit, de les intervencions anteriors i de les preferències del cirurgià. L'última decisió ha de prendre-la moltes vegades el mateix cirurgià, en l'acte quirúrgic.

Es requereix la realització d'una talla vesical o l'ús de sonda uretral postoperatòria.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

La rectificació de la incurvació del penis, si n'hi haguera.
La ubicació del meat uretral en una posició pròxima a la fisiològica.
La normalització de la micció i l'erecció.

3. Alternatives raonables a este procediment

Hi ha una altra alternativa al procediment, l'abstenció terapèutica.

4. Conseqüències previsibles de la realització

Les descrites en els apartats 1 i 2.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En la seua situació actual, el facultatiu considera la present indicació com la millor opció entre les possibles. No obstant això, i atés que ha rebut suficient informació, vosté és, en últim terme, lliure d'acceptar-la o no. En cas de no acceptar la present indicació, ha de saber que hi ha una elevada probabilitat de persistència i/o progressió de la simptomatologia per la qual va consultar o de les seues malalties prèvies. Les possibles complicacions que en un futur puguen succeir i el seu abast són, en bona part, imprevisibles, incloent-hi el risc vital.

6. Riscos

De la dita intervenció, és possible esperar els següents efectes secundaris o complicacions:

- No aconseguir la rectificació completa del penis, persistint cert grau d'incurvació peniana produïda per fibrosi postoperatòria.
- Que el nou meat uretral no puga ubicar-se en el vèrtex del gland.
- No aconseguir millora en la qualitat miccional.
- Necessitar diversos temps quirúrgics (diverses intervencions) per a aconseguir els objectius inicials.
- Durant la intervenció, es poden produir hemorràgies excessives i obertura del conducte uretral.
- Retenció urinària en el postoperatori.
- És freqüent l'aparició de fistules uretrals que necessiten noves intervencions quirúrgiques per a la seua reparació.
- Aparició, a vegades de forma tardana, d'estenosi uretral o de meat, que també requerirà altres intervencions.
- Formació de diverticles i de redundàncies en el conducte uretral.
- A vegades, segons el tipus de pell utilitzat per a la reparació, és possible el creixement de pèl dins del conducte uretral, que pot originar infeccions urinàries i la formació de càlculs. Serà necessària l'extracció endoscòpica del pèl i la fulguració dels fol·licles. A vegades, cal substituir el segment uretral afectat. Després de la intervenció quirúrgica, l'aparença estètica del penis diferix de la normalitat, des del punt
- de vista cosmètic.
- Disfuncions sexuals.
- Infecció de la ferida operatòria.
- Mala cicatrització de les ferides operatòries i, fins i tot, a vegades necrosi dels empelts utilitzats.

El Servei d'Anestèsia l'informarà dels riscos anestèsics.

7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

És necessari que ens informe de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, renals, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància que pugui complicar la intervenció o agreujar el postoperatori.

Per la seua situació actual (diabetis, obesitat, immunodepressió, hipertensió, anèmia, edat avançada...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions, per la qual cosa el risc quirúrgic general és major.

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprès adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat

