



1. Identificació i descripció del procediment

Procediment consistent a eliminar els càlculs vesicals, millorar els símptomes i previndre les complicacions produïdes per estos o per patologies associades.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

El principal objectiu és la desaparició de la litiasi.

3. Alternatives raonables a este procediment

Intent de col·locar un catèter endoscòpicament per la uretra.

4. Conseqüències previsibles de la realització

La millora dels símptomes i la prevenció de complicacions produïdes per esta o altres patologies associades.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En la seua situació actual, el facultatiu considera la present indicació com la millor opció entre les possibles. No obstant això, i atés que ha rebut suficient informació, vosté és, en últim terme, lliure d'acceptar-la o no. En cas de no acceptar la present indicació, ha de saber que hi ha una elevada probabilitat de persistència i/o progressió de la simptomatologia per la qual va consultar o de les seues malalties prèvies. Les possibles complicacions que en un futur puguen succeir i el seu abast són, en bona part, imprevisibles, incloent-hi el risc vital.

6. Riscos

De la dita intervenció és possible, però no freqüent, esperar els següents efectes secundaris o complicacions:

- Impossibilitat de dur a terme l'extracció de la litiasi.
- Perforació d'una ansa intestinal, amb el consegüent risc de peritonitis.
- Hemorràgia incoercible, tant en l'acte quirúrgic com en el postoperatori. Les conseqüències de la dita hemorràgia són molt diverses, depenent del tipus de tractament que es necessite, i oscil·len des d'una gravetat mínima fins a la possibilitat certa de mort, com a conseqüència directa del sagnat o per efectes secundaris dels tractaments emprats.
- Problemes i complicacions derivats de la ferida quirúrgica:
 - Infecció, en els seus diferents graus de gravetat.
 - Dehiscència de sutura (obertura de la ferida), que pot necessitar una intervenció secundària.
 - Fistules temporals o permanents.
 - Defectes estètics derivats d'alguna de les complicacions anteriors o de processos de cicatrització anormals.
 - Intolerància als materials de sutura, que pot arribar fins i tot a la necessitat d'una reintervenció per a extraure'ls.
 - Neuràlgies (dolors nerviosos), hiperestèsies (augment de la sensibilitat) o hipoestèsies (disminució de la sensibilitat).

7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient

És necessari que ens informe de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, renals, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància que pugua complicar la intervenció o agreujar el postoperatori.

Per la seua situació actual (diabetis, obesitat, immunodepressió, hipertensió, anèmia, edat avançada...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions, per la qual cosa el risc quirúrgic general és major.

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostatat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat

