

## RECOMANACIONS PER A L'ACTUACIÓ EN CAS DE VESSAMENT DE FÀRMACS BIOPERILLOSO I EXPOSICIONS ACCIDENTALS

H 08

### Mesures preventives:

#### Davant d'un vessament de productes citostàtics, procedisca de la manera següent:

1. Suspenga l'activitat que estava realitzant.
2. Desallotge l'àrea, i que quede només en la consulta el personal responsable, adequadament protegit.
3. Aïlle l'àrea on s'haja produït el vessament, per a evitar la dispersió de les substàncies abocades.
4. Eixugue el vessament amb cel·lulosa o un drap absorbent (sec si es tracta de líquids i humit si és una pols seca) abans de netejar-lo.
5. Si hi ha restes de vidres no les arreplegue amb la mà sinó amb l'ajuda d'unes pinces (o raspall) i un recollidor d'usar i tirar.
6. Arreplegue els draps impregnats amb un recollidor i deixe'ls en un contenidor BLAU específic de residus citostàtics, rebutge també l'equip que s'ha usat per a la neteja (material absorbent, paleta i granereta d'usar i tirar).
7. Netege la superfície seca amb cel·lulosa amerada d'alcohol 70%, tres vegades amb sabó i finalment rentant amb aigua abundant, sempre de les zones menys contaminades a la més contaminada.

#### Utilitze els següents equips de protecció individual per a fer la neteja i recollida del vessament:

- Guants de protecció estèrils, quirúrgics de làtex, no alergògens, lliures de pols (sense talc), o bé, un parell de guants de nitril amb grossària mínim de 0,3 mm, d'acord amb la norma UNE EN 374.
- Ulleres de protecció contra esguitades de productes químics (lents de policarbonat), d'acord amb la norma UNE EN 166.
- Bata d'usar i tirar de baixa permeabilitat, tancada, amb obertura posterior, mànega llarga i punys elàstics ajustats, protectora contra esguitades de productes químics.
- Màscara de protecció respiratòria tipus FFP2 o FFP3 amb filtre, d'acord amb la norma UNE EN 149.

#### Per a fer la neteja i arreplega del vessament seguisca les següents normes d'higiene:

- Anar desproveïts de joies, articles decoratius...
- No utilitze cosmètics (cremes, maquillatge...)
- Està prohibit menjar, beure o fumar dins de l'àrea.
- Llave's les mans abans de posar-se els guants i després de llevar-se'ls.
- El contenidor de color BLAU, on s'abocaran els residus, serà d'un sol ús, ha de ser rígid i impermeable, resistent a agents químics i materials perforants i que disposen d'un tancament provisional que garantisca la seua estanquitat fins que s'ompliga (no s'ha d'omplir mai més de dos terços del seu contingut) i un tancament hermètic definitiu.

**Comprove que la consulta disposa d'equip d'emergència davant de possibles vessaments, esguitades o abocament d'excretes, que conste de:**

1. Elements de protecció:
  1. Màscara de protecció respiratòria (es recomana amb filtre químic), d'acord amb la norma UNE EN 149.
  2. 2 parells de guants quirúrgics de làtex (es recomana doble davant del vessament de substàncies citotòxiques) o guants de doble grossària (0,45 mm en els dits i 0,27 mm en la palma de la mà), d'acord amb la norma UNE EN 374.
  3. Bata de baixa permeabilitat (d'usar i tirar preferiblement), tancada, amb obertura posterior, mànega llarga i punys elàstics ajustats.
  4. Ulleres de seguretat, d'acord amb la norma UNE EN 166.
  5. Falques.
  6. Gorro.
2. Elements d'absorció per a líquids o que ameren.
3. Elements d'arregla: poal, fregadora, bossa.



4. Ventile la consulta abans de reprendre l'activitat.
5. Davant qualsevol dubtel, dirigisca's al responsable del servei, que vetlarà pel compliment d'estes recomanacions.

**Actuació en cas d'exposició accidental a productes citostàtics:**

- Quan es produïska una contaminació de l'equip de protecció, retire'l immediatament, i llave la pell.
- En cas d'ingestió accidental, acudisca immediatament al metge.
- En cas de contacte directe amb la pell o mucoses, llave immediatament amb aigua i sabó la zona afectada durant aproximadament 10 minuts.
- En el cas d'afectació ocular, irrigue abundantment amb sèrum fisiològic, consulte immediatament al metge i realitze un seguiment mèdic.

**Actuació en cas d'extravasació:**

- Pose's en contacte amb el facultatiu del servei corresponent i informe's si disposa d'antídot.