
 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b> Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	<b>NOTA INFORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
	<b>Ús d'equips de protecció després de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19</b>	V.01 10.07.2023

Després de la declaració de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19<sup>1</sup>, es recorda que:


- El personal ha d'utilitzar els **equips de protecció individual adequats al risc** enfront del qual s'ha de protegir, segons les indicacions establides per al lloc de treball o activitat a realitzar.
- Els equips de protecció individual són un complement d'altres **mesures de protecció col·lectives** (ventilació adequada, neteja i desinfecció, gestió de residus, ...), les quals han de mantindre's d'acord amb la legislació vigent, per a disminuir el risc de transmissió d'agents infecciosos en centres sanitaris.
- La **vacunació** és una estratègia clau per a la prevenció de les malalties infeccioses.
- Per a la prevenció i control de les infeccions s'han d'aplicar les **precaucions estàndard i les precaucions basades en mecanismes de transmissió**, utilitzant adequadament els equips de protecció:

**En l'atenció i cura de qualsevol pacient** s'han d'aplicar les **precaucions estàndard (PE)**. En l'activitat assistencial, abans de fer una tasca, tècnica o procediment, el treballador/a ha de valorar el risc d'exposar-se a fluids, secrecions o excrecions corporals potencialment infecciosos i/o superfícies contaminades pel pacient, per a seleccionar la protecció adequada en funció del risc de la tasca a realitzar.

ESCENARI D'EXPOSICIÓ	PRECAUCIONS ESTÀNDARD: equips de protecció i higiene de mans (qualsevol pacient)				
	HIGIENE DE MANS 	GUANTS 	BATA 	MÀSCARA QUIRÚRGICA * 	PROTECCIÓ OCULAR 
Abans i després del contacte amb pacients i després del contacte amb l'entorn del pacient					
Procediments amb contacte potencial amb sang, fluids corporals, mucoses o pell no intacta					
Procediments amb el risc de vessament o esquitxades sobre el cos o la cara del treballador/a					













\* Es recomana substituir per màscara FFP2/FFP3 quan es realitzen procediments generadors d'aerosols.

<sup>1</sup> Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol.

 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b> Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	<b>NOTA INFORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
	<b>Ús d'equips de protecció després de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19</b>	V.01 10.07.2023

**En l'atenció i cura de pacient amb sospita diagnòstica o confirmació d'infecció respiratòria aguda (IRA):**

- S'ha d'oferir màscara quirúrgica al pacient, sempre que la seua situació clínica ho permeta.
- S'han de complementar les mesures de precaució estàndard (PE) amb les **precaucions basades en el mecanisme de transmissió**.

MECANISME DE TRANSMISSIÓ	PRECAUCIONS BASADES EN MECANISME DE TRANSMISSIÓ: equips de protecció i higiene de mans (pacient amb infecció respiratòria aguda)					
	HIGIENE DE MANS	MÀSCARA QUIRÚRGICA	MÀSCARA FFP2/FFP3	PROTECCIÓ OCULAR	BATA	GUANTS
<b>GOTES</b> (ex. Grip)						
				Segons PE	Segons PE	Segons PE
<b>AÈRIA</b> (ex. COVID-19)						
					Segons PE	Segons PE

En procediments d'alt risc, com a procediments generadors d'aerosols (PGA) es recomana màscara FFP2/ FFP3, protecció ocular, bata i guants.

Consulte la informació sobre l'ús adequat d'EPI. Cal veure les fitxes:

- [H-16 Normes generals per a l'ús d'EPI. v.03](#)
- [H-17 Utilització correcta dels guants. v.01](#)
- [H-18 Protecció respiratòria: màscares FFP. v.01](#)

- **Protecció a persones vulnerables** (segons les indicacions d'"Ús de màscares en centres sanitaris"<sup>2</sup>). El personal ha d'utilitzar màscara:
  - En cas d'infecció respiratòria aguda (IRA) simptomàtica o confirmada quan s'estiga en espais compartits.
  - Quan s'atenga casos simptomàtics d'IRA (*s'utilitzaran les mesures i EPI adequats a la situació*)
  - Quan es treballa en unitats de vigilància intensiva i en unitats amb pacients vulnerables, com a Hematologia, Crítics, Oncologia i Unitats de Cremats

Es recomana l'ús de màscara en les urgències hospitalàries, d'atenció primària (PAC-PAS), incloses les sales d'espera.

Es recomana l'ús de màscara al personal vulnerable.

<sup>2</sup> Nota informativa "Ús de màscara en centres sanitaris". Direcció General d'Assistència Sanitària. 05.07.2023

**Fonts:** Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2017. Recomanacions sobre precaucions estàndard i precaucions basades en la transmissió de microorganismes. Disponible en: [https://www.resistenciaantibioticos.es/sites/default/files/2022-04/recomendaciones\\_sobre\\_precauciones\\_estandar.pdf](https://www.resistenciaantibioticos.es/sites/default/files/2022-04/recomendaciones_sobre_precauciones_estandar.pdf). Standard precautions for the prevention and control of infections. Aide-memoire. WHO, June 2022. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/who-uhl-ihs-ipc-2022.1> European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations for infection prevention and control in relation to respiratory viral infections in healthcare settings. 6 February 2023. ECDC: Stockholm; 2023. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-infection-prevention-and-control-practices-relation-respiratory>